

(本试剂盒仅供体外研究使用，不用于临床诊断!)

Elabsience® L-乳酸 (LA) 比色法测试盒

L-Lactic Acid (LA) Colorimetric Assay Kit

产品货号: E-BC-K044-M

产品规格: 48T(32 samples)/96T(80 samples)

检测仪器: 酶标仪(520-540 nm)

使用前请仔细阅读说明书。如果有任何问题，请通过以下方式联系我们：

销售部电话 027-87879180, 027-87854967

技术部电话 13129966790

电子邮箱 (销售) Perry@elabsience.cn

电子邮箱 (技术) biochemical@elabsience.cn

网址 www.elabsience.cn

具体保质期请见试剂盒外包装标签。请在保质期内使用试剂盒。

联系时请提供产品批号(见试剂盒标签)，以便我们更高效地为您服务。

用途

本试剂盒适用于检测血清（浆）、细胞上清、组织、细胞等样本中乳酸的含量。

检测原理

以氧化型辅酶I (NAD⁺) 为氢受体，乳酸脱氢酶 (LDH) 催化乳酸脱氢产生丙酮酸，使 NAD⁺转化为还原型辅酶I (NADH)。其中 N-甲基吩嗪甲基硫酸盐 (PMS) 递氢使氯化硝基四氮唑蓝 (NBT) 还原为紫色呈色物，呈色物的吸光度在 530 nm 时与乳酸含量呈线性关系。

本试剂盒检测组织和细胞样本时，需测定总蛋白浓度，推荐使用 BCA 法（货号：E-BC-K318-M）。

提供试剂和物品

编号	名称	规格 1 (Size 1)(48 T)	规格 2 (Size 2)(96 T)	保存方式 (Storage)
试剂一 (Reagent 1)	缓冲液(Buffer Solution)	6 mL×1 瓶	6 mL×2 瓶	2-8℃保存 6个月
试剂二 (Reagent 2)	酶贮备液(Enzyme Stock Solution)	0.06 mL×1 支	0.06 mL×2 支	2-8℃保存 6个月
试剂三 (Reagent 3)	显色剂(Chromogenic Agent)	1.2 mL×1 支	1.2 mL×2 支	2-8℃避光 保存6个月
试剂四 (Reagent 4)	终止液(Stop Solution)	12 mL×1 瓶	12 mL×2 瓶	2-8℃保存 6个月
试剂五 (Reagent 5)	10 mmol/L 标准品(10 mmol/L Lactic Acid Standard)	1 mL×1 支	1 mL×2 支	2-8℃保存 6个月
	96 孔酶标板	1 板		
	96 孔覆膜	2 张		
	样本位置标记表	1 张		

说明：试剂严格按上表中的保存条件保存，不同测试盒中的试剂不能混用。

对于体积较少的试剂，使用前请先离心，以免量取不到足够量的试剂。

所需自备物品

仪器：酶标仪（520-540 nm，最适检测波长 530 nm）、涡旋混匀仪、37℃恒温箱、微量移液器（1000 μ L，200 μ L，100 μ L，10 μ L）、离心机。

耗材：枪头（1000 μ L，200 μ L，10 μ L）、EP 管（0.5 mL、2 mL、10 mL）。

试剂：去离子水、生理盐水（0.9% NaCl）或 PBS（0.01 M，pH 7.4）

试剂准备

① 检测前，试剂一、三、四、五需平衡至室温，试剂二需置于冰上备用。

② 酶工作液的配制：

按试剂一：试剂二为100：1的体积比混匀，现用现配，仅限当日使用。

③ 不同浓度标准品的稀释：

编号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
标准品浓度(mmol/L)	0	1	2	3	4	5	6	7
10 mmol/L 标准品 (μ L)	0	20	40	60	80	100	120	140
去离子水 (μ L)	200	180	160	140	120	100	80	60

样本准备

① 样本处理

血清血浆等液体样本：可直接测定。

组织样本：常规匀浆处理(生理盐水(0.9% NaCl 溶液)或PBS(0.01 M, pH 7.4)。匀浆后，4℃，10000×g 离心 10 min，取上清置于冰上待测。留取部分上清用于蛋白浓度测定。

细胞样本：取 10^6 细胞加入300 μL生理盐水(0.9% NaCl溶液)或PBS(0.01 M, pH 7.4)进行匀浆。匀浆后，4℃，10000×g离心10 min，取上清置于冰上待测。留取部分上清用于蛋白浓度测定。

② 样本的稀释

在正式检测前，需选择2-3个预期差异大的样本稀释成不同浓度进行预实验，根据预实验的结果，结合本试剂盒的线性范围：0.12-7.0 mmol/L，请参考下表稀释(仅供参考)：

样本	稀释倍数	样本	稀释倍数
人血清	2-5	HepG2 细胞上清	不稀释
10%大鼠肾脏组织	1-3	HepG2 细胞	不稀释
10%大鼠脑组织	不稀释		

注：稀释液为生理盐水(0.9% NaCl)或PBS(0.01 M, pH 7.4)。

实验关键点

- ① 试剂一取用时应倒出部分，再取用，避免试剂污染。
- ② 样本加入板孔中时，应触底加入。

操作步骤

- ① 标准孔：取 5 μL 不同浓度标准品，加入到对应的标准孔中；
样本孔：取 5 μL 待测样本，加入到样本孔中。
- ② 向①中各孔加入 100 μL 酶工作液。
- ③ 向②中各孔加入 20 μL 试剂三。
- ④ 37°C条件下孵育 10 min。
- ⑤ 向标准、测定各孔中加入 180 μL 试剂四。
- ⑥ 酶标仪上振荡 5 s，酶标仪 530 nm 处，测定各孔 OD 值。

操作表

	标准孔	测定孔
不同浓度标准品 (μL)	5	
待测样本 (μL)		5
酶工作液 (μL)	100	100
试剂三 (μL)	20	20
37°C孵育 10 min		
试剂四 (μL)	180	180
酶标仪上震板 5 s，酶标仪 530 nm 处，测定各孔 OD 值。		

本试剂盒检测组织和细胞样本时，需测定总蛋白浓度，推荐使用 BCA 法(货号：E-BC-K318-M)。

结果计算

标准品拟合曲线： $y = ax + b$

血清（浆）、细胞上清等液体中乳酸含量计算公式：

$$\begin{aligned} \text{LA 含量} \\ (\text{mmol/L}) \end{aligned} = (\Delta A_{530} - b) \div a \times f$$

组织、细胞中乳酸含量计算公式：

$$\begin{aligned} \text{LA 含量} \\ (\text{mmol/gprot}) \end{aligned} = (\Delta A_{530} - b) \div a \div C_{pr} \times f$$

注解：

ΔA_{530} ：样本测定 OD 值-空白 OD 值（标准品浓度为 0 时的 OD 值）

f：样本加入检测体系之前的稀释倍数

C_{pr} ：待测样本的蛋白浓度（gprot/L）


附录1 关键数据

1. 技术参数

检测范围	0.12-7.0 mmol/L	平均批间差	3.5%
灵敏度	0.10 mmol/L	平均批内差	1.4%
平均回收率	105%		

2. 标准曲线(数据仅供参考)

① 标准曲线 (数据仅供参考) :



附录2 实例分析


例如检测人血清(数据仅供参考):

将血清: 双蒸水=1:4稀释, 取5 μL 稀释后的人血清, 按操作表检测, 结果如下。

LA的标准曲线: $y = 0.12763x - 0.01033$, 测定孔平均OD值为0.414, 空白OD值为0.052, 计算结果为:

$$\text{LA (mmol/L)} = (0.414 - 0.052 + 0.01033) \div 0.12763 \times 5 = 14.59 \text{ mmol/L}$$

按照说明书操作, 测定人血清(稀释倍数5, 加样量5 μL)、HepG2细胞上清(加样量5 μL)、大鼠肾脏组织(10%组织匀浆的蛋白含量7.18 gprot/L, 加样量5 μL)、和HepG2细胞(蛋白含量9.55 gprot/L, 加样量5 μL)中乳酸含量(如下图):



附录3 问题答疑

问题	可能原因	建议解决方案
样本显色很低	孵育时间太短	保证充足的孵育时间
样本测不出值	样本稀释倍数太大	选择合适稀释倍数,重新检测
	样本保存时间过长或者保存不当	取新鲜样本,重新检测
样本测量结果>7.0 mmol/L	样本浓度太高	选择合适稀释倍数,重新检测

声明

1. 试剂盒仅供研究使用,如将其用于临床诊断或任何其他用途,我公司将不对因此产生的问题负责,亦不承担任何法律责任。
2. 实验前请仔细阅读说明书并调整好仪器,严格按照说明书进行实验。
3. 实验中请穿着实验服并戴乳胶手套做好防护工作。
4. 试剂盒检测范围不等同于样本中待测物的浓度范围。如果样品中待测物浓度过高或过低,请对样本做适当的稀释或浓缩。
5. 若所检样本不在说明书所列样本类型之中,建议先做预实验验证其检测有效性。
6. 最终的实验结果与试剂的有效性、实验者的相关操作以及实验环境等因素密切相关。本公司只对试剂盒本身负责,不对因使用试剂盒所造成的样本消耗负责,使用前请充分考虑样本可能的使用量,预留充足的样本。

附录4 客户发表文献

1. Mu X, Xiang Z, Xu Y, et al. Glucose metabolism controls human $\gamma\delta$ T-cell-mediated tumor immunosurveillance in diabetes[J]. Cellular & Molecular Immunology. IF:22.096
2. Tseng S.Ja. An acid degradable, lactate oxidizing nanoparticle formulation for non-small cell lung cancer virotherapy[J]. Nano Today. IF:18.962
3. Zhang H, Zheng Q, Guo T, et al. Metabolic reprogramming in astrocytes results in neuronal dysfunction in intellectual disability. Mol Psychiatry. 2022. IF:15.992
4. Salman T M, Iyanda M A, Alli-Oluwafuyi A M, et al. Telfairia occidentalis stimulates hepatic glycolysis and pyruvate production via insulin-dependent and insulin-independent mechanisms[J]. Metabolism Open, 2021, 10(1-10):100092. IF:8.694
5. Li Q, Peng J, Luo Y, et al. Far infrared light irradiation enhances A β clearance via increased exocytotic microglial ATP and ameliorates cognitive deficit in Alzheimer's disease-like mice. J Neuroinflammation. 2022; 19 (1):145. IF:7.573
6. Zeng X Peng, Wang L J, Guo L H, et al. Dasatinib ameliorates chronic pancreatitis induced by caerulein via anti- fibrotic and anti-inflammatory mechanism[J]. Pharmacological Research, 2019, 147, 104357. IF:5.574
7. Daily Dose of Bovine Lactoferrin Prevents Ethanol-Induced Liver Injury and Death in Male Mice by Regulating Hepatic Alcohol Metabolism and Modulating Gut Microbiota[J]. Molecular Nutrition & Food Research. IF:5.426
8. Wang Y, Xie W, Feng Y, et al. Epithelial-derived exosomes promote M2 macrophage polarization via Notch2/SOCS1 during mechanical ventilation. Int J Mol Med. 2022; 50 (1). IF:5.314
9. Yu C, Wang D, Tong Y, et al. Trans -Anethole Alleviates Subclinical Necro-Haemorrhagic Enteritis-Induced Intestinal Barrier Dysfunction and Intestinal Inflammation in Broilers. Front Microbiol. 2022; 13:831882. IF:5.259
10. Xu Y , Zhang Y , Xu Y , et al. Activation of CD137 signaling promotes macrophage apoptosis dependent on p38 MAPK pathway-mediated mitochondrial fission[J]. The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 2021 Jul; 136:106003. IF:5.085
11. Naseh A, Shirin B, Maryam M, et al. Attenuation of chronic arsenic neurotoxicity via melatonin in male offspring of maternal rats exposed to arsenic during conception: Involvement of oxidative DNA damage and inflammatory signaling cascades[J]. Life Sciences 266 (2021) 118876. IF:5.037

12. Zhong J, Sun P, Xu N, et al. Canagliflozin inhibits p-gp function and early autophagy and improves the sensitivity to the antitumor effect of doxorubicin[J]. *Biochemical Pharmacology*, 2020, 175: 113856. **IF:4.96**
13. Wang L J, He L, Hao L, et al. Isoliquiritigenin ameliorates caerulein-induced chronic pancreatitis by inhibiting the activation of PSCs and pancreatic infiltration of macrophages[J]. *Journal of Cellular and Molecular Medicine*, 2020. **IF:4.486**
14. Laurian R, Ravent J, Dementhon K, et al. *Candida albicans* Hexokinase 2 Challenges the *Saccharomyces cerevisiae* Moonlight Protein Model[J]. *Microorganisms*, 2021, 9(4):848. **IF:4.128**
15. Liu J, Duan P, Xu C Y, et al. CircRNA circ-ITCH improves renal inflammation and fibrosis in streptozotocin-induced diabetic mice by regulating the miR-33a-5p/SIRT6 axis[J]. *Inflammation Research*, 2021. **IF:4.114**
16. Yu H, Zhang L, Chen P, et al. Dietary bile acids enhance growth, and alleviate hepatic fibrosis induced by a high starch diet via AKT/FOXO1 and cAMP/AMPK/SREBP1 pathway in *Micropterus salmoides*[J]. *Frontiers in Physiology*, 2019, 10. **IF:3.367**
17. Sohini Sen, Shaunak Ghosh, Sayantan De, et al. Immunomodulatory and antimicrobial non-mulberry *Antheraea mylitta* silk fibroin accelerates in vitro fibroblast repair and regeneration by protecting oxidative stress[J]. *RSC Advances*, 2021 May; 11(31):19265-19282. **IF:3.361**
18. Li Jianda, Yuan Chen, Liu Peng et al. Red blood cells serve as a vehicle for PEDV transmission.[J]. *Vet Microbiol*, 2021, 257: 109081. **IF:3.293**
19. Ali A, Elsherbiny D, Azab S, et al. The diuretic amiloride attenuates doxorubicin-induced chemobrain in rats: Behavioral and mechanistic study[J]. *Neurotoxicology*, 2021, 88:1-13. **IF:3.088**
20. Yang H, Gan S, Jiang Z, et al. Protective effects of essential oil from *Fructus Alpiniae zerumbet* on retinal Müller gliosis via the PPAR- γ -p-CREB signaling pathway[J]. *Chinese Medicine*, 2020, 15(1): 4. **IF:2.96**
21. Chen Wenqi, Li Yuehua, Zhong Jing et al. circ-PRKCI targets miR-1294 and miR-186-5p by downregulating FOXK1 expression to suppress glycolysis in hepatocellular carcinoma.[J]. *Mol Med Rep*, 2021, 23: undefined. **IF:2.952**
22. Cui Y, Wang Y, Liu G. Protective Effect of Barbaloin in a Rat Model of Myocardial Ischemia Reperfusion Injury Through the Regulation of the CNPY2 \uparrow PERK Pathway[J]. *International Journal of Molecular Medicine*, 2019. **IF:2.928**

23. Li H, Xia T, Guan Y, et al. Sevoflurane Regulates Glioma Progression by Circ_0002755/miR-628-5p/MAGT1 Axis[J]. *Cancer Management and Research*, 2020, 12: 5085. **IF:2.886**
24. Cheng F, Yu J, Zhang X, et al. CircSEC31A Promotes the Malignant Progression of Non-Small Cell Lung Cancer Through Regulating SEC31A Expression via Sponging miR-376a[J]. *Cancer Management and Research*, 2020, Volume 12:11527-11539. **IF:2.886**
25. Sanjeev S, Murthy M K, Devi M S, et al. Isolation, characterization, and therapeutic activity of bergenin from marlberry (*Ardisia colorata* Roxb.) leaf on diabetic testicular complications in Wistar albino rats[J]. *Environmental Science and Pollution Research*, 2019: 1-20. **IF:2.8**
26. Dede A, Arslanyolu M. The in vivo *Tetrahymena thermophila* extracellular glucose drop assay for characterization of mammalian insulin activity[J]. *European Journal of Protistology*, 2021, 79(1):125803. **IF:2.432**
27. Wang F, Chen H, Chen Y, et al. Diet-induced obesity is associated with altered expression of sperm motility-related genes and testicular post-translational modifications in a mouse model[J]. *Theriogenology*, 2020. **IF:2.094**
28. Bhargava P, Verma V K, Malik S, et al. Hesperidin Regresses Cardiac Hypertrophy by Virtue of PPAR- γ Agonistic, Anti-Inflammatory, Antiapoptotic, and Antioxidant Properties[J]. *Journal of biochemical and molecular toxicology*, 2019: e22283. **IF:1.837**
29. Adeyemi W J, Abdussalam T A, Abdulrahim A, et al. Elevated, sustained, and yet reversible biotoxicity effects of lead on cessation of exposure: Melatonin is a potent therapeutic option[J]. *Toxicology and Industrial Health*, 2020, 36(7): 477-486. **IF:1.708**
30. Ustunova S, Takir S, Yilmazer N, et al. Hydrogen sulphide and nitric oxide cooperate in cardioprotection against ischemia/reperfusion injury in isolated rat heart[J]. *in vivo*, 2020, 34(5): 2507-2516. **IF:1.541**